＜白血病＞

2020/3/25作成
2021/12/1改訂

IDR+Ara-C[寛解導入]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イダルビシン	12mg/㎡	●	●	●											
シタラビン	100mg/㎡	●	●	●	●	●	●	●							

DNR+Ara-C[寛解導入]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ダウノルビシン	50mg/㎡	●	●	●	●	●									
シタラビン	100mg/㎡	●	●	●	●	●	●	●							

IDR+Ara-C[地固め]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イダルビシン	12mg/㎡	●	●	●											
シタラビン	140mg/㎡	●	●	●	●	●									

DNR+Ara-C[地固め]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ダウノルビシン	50mg/㎡	●	●	●											
シタラビン	200mg/㎡	●	●	●	●	●									

MIT+Ara-C[地固め]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ミトキサントロン	7mg/㎡	●	●	●											
シタラビン	200mg/㎡	●	●	●	●	●									

ACR+Ara-C[地固め]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ミトキサントロン	20mg/㎡	●	●	●	●	●									
シタラビン	200mg/㎡	●	●	●	●	●									

大量Ara-C		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
メトトレキサート	2000mg/㎡×2	●	●	●	●	●																

大量MTX		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メトトレキサート	3500mg/㎡	●													

Low dose Ara-C		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
シタラビン	10mg/㎡×2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LSG15		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
プレドニゾロン	40mg/㎡	●							●							●	●	●				
ビンクリスチン	1mg/㎡※	●																				
ドキソルビシン	40mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	350mg/㎡	●																				
ドキソルビシン	30mg/㎡								●													
ラニムスチン	60mg/㎡								●													
カルボプラチン	250mg/㎡															●						
エトポシド	100mg/㎡															●	●	●				
ビンデシン	2.4mg/㎡															●						

※ 上限2mg/body

CAG		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シタラビン	10mg/㎡×2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
アクラルビシン	14mg/㎡	●	●	●	●																	
G-CSF	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

※ 状況によっては使用しない場合あり

ブリナツモマブ[1～5サイクル目]		1コース=42日																
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-28	29-40	41	42
ブリナツモマブ	28μg/body	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ブリナツモマブ[6～9サイクル目]		1コース=84日																
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-28	29-82	83	84
ブリナツモマブ	28μg/body	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

※ 45kg以上の患者に使用

※ 1サイクル目day1～7は9μg/body

【APL用】IDR単剤[地固め]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イダルビシン	12mg/㎡	●	●	●											

【APL用】DNR単剤[地固め]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ダウノルビシン	50mg/㎡	●	●	●											

【APL用】MIT単剤[地固め]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ミトキサントロン	7mg/㎡	●	●	●											

三酸化ヒ素[寛解導入]		1コース=7日						
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7
三酸化ヒ素	0.15mg/kg	●	●	●	●	●	●	●

※ 寛解が得られるまで投与　合計投与回数60回を超えないこと

三酸化ヒ素[寛解後]		1コース=5日				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5
三酸化ヒ素	0.15mg/kg	●	●	●	●	●

※ 5週間で合計25回投与

L-アスパラギナーゼ		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-アスパラギナーゼ	100K単位/kg	●	●	●	●	●	●	●							

ALL202-U[寛解導入]		1コース=35日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
メトトレキサート	12mg/body	●							●													
シタラビン	30mg/body								●													
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●	●	●														
プレドニゾロン	60mg/body															●	●	●	●	●	●	●
デキサメタゾン	20mg/body								●	●	●	●	●	●	●							
ビンクリスチン	1.5mg/㎡								●							●						
ピラルビシン	25mg/㎡								●	●												
シクロホスファミド	1200mg/㎡										●											
L-アスパラギナーゼ	6000K単/㎡															●		●		●		●

抗がん剤名	用量	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
メトトレキサート	12mg/body	●													
シタラビン	30mg/body	●													
プレドニゾロン	60mg/body	●	●	●	●	●	●	●							
ビンクリスチン	1.5mg/㎡	●							●						
ピラルビシン	25mg/㎡														
シクロホスファミド	1200mg/㎡														
L-アスパラギナーゼ	6000K単/㎡		●		●		●		●						

※ 25歳未満に使用

※ ビンクリスチン：上限2mg/body

ALL202-O[寛解導入]		1コース=28日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ビンクリスチン	1.3mg/㎡	●							●							●						
ダウノルビシン	60mg/㎡	●	●	●																		
シクロホスファミド	1200mg/㎡	●																				
L-アスパラギナーゼ	3000K単/㎡									●		●		●			●		●		●	

抗がん剤名	用量	22	23	24	25	26	27	28
ビンクリスチン	1.3mg/㎡	●						
ダウノルビシン	30mg/㎡							
シクロホスファミド	1200mg/㎡							
L-アスパラギナーゼ	3000K単/㎡							

※ 25歳以上60歳未満に使用

※ ビンクリスチン：上限2mg/body

FLAGM		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-26	27	28
フルダラビン	15mg/㎡×2		●	●	●	●														
シタラビン	2000mg/㎡×2		●	●	●	●														
ミトキサントロン	10mg/㎡				●	●	●													
G-CSF	※	●	●	●	●															

※ 状況によっては使用しない場合あり

FC		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
フルダラビン	25mg/㎡	●	●	●																
シクロホスファミド	250mg/㎡	●	●	●																

FCR		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
リツキシマブ	500mg/㎡	●																		
フルダラビン	25mg/㎡		●	●	●															
シクロホスファミド	250mg/㎡		●	●	●															

※ 初回は375mg/㎡

B-ALL97 REGIMEN-A		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
メトトレキサート	15mg/body	●																				
メトトレキサート	500mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	200mg/㎡	●	●	●	●	●																
ビンクリスチン	1.3mg/㎡※		●																			
ドキソルビシン	50mg/㎡					●																
デキサメタゾン	16mg/body	●	●	●	●	●																

※ 上限2mg/body

B-ALL97 REGIMEN-B		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
メトトレキサート	15mg/body	●																				
メトトレキサート	500mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	200mg/㎡	●	●	●	●	●																
ビンクリスチン	1.3mg/㎡※		●																			
エトポシド	100mg/㎡		●	●	●	●																
デキサメタゾン	16mg/body	●	●	●	●	●																

※ 上限2mg/body

モガムリズマブ		1コース=7日						
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7
モガムリズマブ	1mg/kg	●						

※ 適応により1週間毎もしくは2週間毎で投与

クラドリビン		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
クラドリビン	0.09mg/kg	●	●	●	●	●	●	●												

髄注MTX・DEX		1コース=1日
抗がん剤名	用量	1
メトトレキサート	15mg/body	●
デキサメタゾン	4mg/body	●

髄注MTX・Ara-C・PSL		1コース=1日
抗がん剤名	用量	1
メトトレキサート	15mg/body	●
シタラビン	40mg/body	●
プレドニゾロン	10mg/body	●

リツキシマブ（CLL）		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
リツキシマブ	500mg/㎡	●																		

※ 初回は375mg/㎡

＜骨髄異形成症候群＞

アザシチジン		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
アザシチジン	75mg/㎡	●	●	●	●	●	●	●												

※ 外来で実施時は休日を避ける

CAG		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シタラビン	10mg/㎡×2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
アクラルビシン	14mg/㎡	●	●	●	●																	
G-CSF	※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

※ 状況によっては使用しない場合あり

Low dose Ara-C		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
シタラビン	10mg/㎡×2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●